

POSTOPERATİF AKUT PANKREATİT VE KORUMA

Ismail Kayabaklı*

Nusret Aras**

Ercüment Kuterdem***

Postoperatif akut pankreatit (POAP) özellikle üst karın ameliyatlarından sonra görülen bir komplikasyondur. En çok mide duodenum, safra kesesi ve dış safra yolları ameliyatları ile pankreas cerrahisinden sonra ortaya çıkarsa da bazı ret-roperitoneel ameliyatlardan sonra görüldüğü de bildirilmiştir.

POAP cerrahları üzen, giderilmesi güç olduğu gibi bazen daha önce araya giren komplikasyonlar nedeni ile tanınması ve tedavisi güç bir hastalık olarak bilinir.

MATERIAL

Bu çalışmada AÜTF Genel Cerrahi Kliniğinde 1972-1981 yılları arasında ameliyat edilen hastalar arasında saptanan 13 olgu ve bu konudaki kaynaklar incelenmiştir.

BULGULAR

13 hastayı içeren grubumuzda 10 erkek hastaya karşın üç kadın hasta vardı. Hastaların en genci 38, en yaşlısı ise 69 yaşında idi. Yaş ortalaması 47 idi. 13 olgunun 12 sinde uygulanan üst karın ameliyatından sonra POAP oluşurken bir olgumuzda ise sigmoid kolon kanseri nedeni ile yapılan anterior rezeksiyonu takiben POAP olmuştu. POAP olgularımızın altısında dış safra ameliyatlarını takiben POAP görülmüşti (% 46) mide - duodenum girişiminden sonra görülen olgular da altı adetti (% 46).

Hastalarımızda POAP'e ilişkin bulgular 24 saat ile 5 gün arasında ortaya çıkmıştır. Koledok taşı nedeni ile sfinkterotomi yapılan bir olgumuzda ise postoperatif 14. gündə T dreninden kolonjografi yapılmasını takiben ortaya çıkmıştır. Ağrı ve şok hastaların hepsinde görülen bir semptomdu. Bulantı ve kusma % 70 olgumuzda görülmüşken kolon rezeksiyonundan sonra POAP görülen tek olgumuzda ise Gray - Turner belirtisi görülmüştür.

* AÜTF Genel Cerrahi Birimi Öğretim Üyesi

** AÜTF Genel Cerrahi Birimi Öğretim Üyesi

*** AÜTF Genel Cerrahi Birimi Öğretim Üyesi

13 olgumuzdan 10 tanesi kaybedilmiş, üç tanesi ise hayatta kalmıştır. Mortalite oranı % 77 dir.

Bu hastaların hastalıklarına ilişkin ayrıntılar, POAP'e neden olan cerrahi girişimler, hastalığın sonucu ve hayatta kalma süreleri Tablo - 1 de gösterilmiştir.

Hastalarımızda açlık kan şekeri düzeyleri sonucu etkileyen bir faktör olarak dikkati çekmiş ve açlık kan şekeri düzeyleri yüksek olan hastaların hemen hep sinin ölümcül olarak sonuçlandığı dikkati çekmiştir. Kan ve idrar amilazı araştırılan hastalarda bu değerler yüksek bulunmakla beraber tanısal bir değer taşımamıştır. Ayrıca serum kalsiyumu % 7 mg'in altına düşen üç hastamız da kaybedilmiştir. Bu durum bu konudaki klasik bilgilere uymaktadır.

Hastalarımızın tedavisinde üç olguda cerrahi drenaj uygulanmış (% 23), 10 olguda ise (% 77) tutumcul tedavi yapılmıştır. Drenaj uygulanan hastaların ikisi, tutumcul tedavi yapılmıştır. Drenaj uygulanan hastaların ikisi, tutumcul tedavi uygulanan hastaların sekizi kaybedilmiştir. Tutumcul tedavi uygulanan hastalara sıvı ve eilektrolit kayıplarının tamamlanması yanında antikolinergic tedavi de uygulanmıştır. Bu hastalara ayrıca bir trypsin inhibitörü olan traslol de verilmiştir. Antibiyotikler de bu komplikasyon saptandığında rutin olarak kullanılmıştır.

TARTIŞMA

Postoperatif akut pankreatit etyolojisinde

- 1 — Pankreas damarlarının yaralanması
- 2 — Pankreas dokusunun travması ve dış salgı kanallarının yaralanması
- 3 — Oddi sfinkterinin spazmı
- 4 — Duodenum kapsamının durgunluğu etkili nedenler arasındadır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi POAP daha çok üst karın ameliyatlarından sonra görülmekle beraber retroperitoneal ameliyatlardan sonra da görüldüğü bildirilmiştir (11,23). Sadece koledok araştırılması yapılan ve özellikle Oddi sfinkterinden geçirerek uygulanan Cattel tipi Koledok drenajından sonra POAP'in daha çok görüldüğü bildirilmiştir (3,6). Bu gün bu tip uygulamaya seyrek olarak başvurulmaktadır.

Pankreas yöresinde yapılan disseksiyonlarda da akut pankreatit oluşabilir. Santorini kanalının bağlanması, pankreasın besleyici arterlerinin ligasyonu (2,5), hipovolemik şok'dan sonra görülen mikroemboluslar da POAP etyolojisinde etkili olabilemektedir (3).

% 10 olguda pankreas ana boşaltıcı kanalının Santorini kanalı olduğu saptanmıştır (5,7), böyle olgularda Santorini kanalının yaralanması hemen daima POAP ile sonuçlanmaktadır. Mide rezeksiyonları sırasında oluşan pankreas yaralanmalarından sonra POAP görülüp görülmemesi bazı şartlara bağlıdır :

- 1 — Yaralanmanın şekli (duktus ligasyonu veya laserasyonu)
- 2 — Yaralanan duktusun büyüğü ve fonksiyonel önemi
- 3 — Kullanılan sütür materyeli

Bazen ufak bir yaralanma POAP'a yol açtığı gibi, peripankreatik nedeni ile de POAP oluşabilir. Emilebilir dikiş materyeli ile yapılan pankreas cerrahisinde pankreas enzimlerinin aktive olarak bu sütürleri eritmeye davet edebilir. Bu bakımdan pankreas cerrahisinde kullanılan sütür materyelinin emilmez olması bir zorunluluğudur (7).

Tablo 1 - Akut Pankreatitli hastaların klinik ve laboratuvar bulguları ile yaşam süreleri

Yaş Cins	Hastalık	Yapılan Girişim	Süre	Ağrı	Şok	Belantı, Küsme	Atomi	Sarılık	İdrar	AKŞ % mg	Girişim	Süresi	Sonuç
1 35 E Kr. Oddit Sarılık	Sfinkteroplasti	24 s.	+	+	-	-	-	-	N	232 Drenaj	15 gün şifa		
2 39 E Mide Ca.	Subtot. M. rez.	24 s.	+	+	-	-	-	-	N	352 Drenaj	24 s. Ex.		
3 69 E Sigmoid Ca.	Ant. rez.	72 s.	+	+	-	+	-	-	N	160 θ	24 s. Ex.		
4 44 E Pilor Stenozu	Vagotomi, Piloroplasti	24 s.	+	+	+	+	+	-	N	75 θ	48 s. Ex.		
5 47 E Koledok taşı	Kolesistektoni, Koledoktoni	72 s.	+	+	-	-	-	-	N	140	15 gün şifa		
6 45 E Koledok taşı	Kolesistektoni, Sfinkteroplasti	5 gün	+	+	-	+	-	-	N	120 θ	8 gün şifa		
7 55 E Mide ülseri	Mide rez.	4 gün	+	+	+	+	+	-	N	110 θ	4 gün Ex.		
8 45 K Taşlı, kolesistit Kronik Oddit	Koelsistektoni sfinkteroplasti	14 gün	+	+	+	+	+	-	Amil.	440 θ	5 gün Ex. (+)		
9 41 K Mide Ca.	Mide rez.	48 s.	+	+	+	+	+	-	N	123 θ	6 gün Ex.		
10 55 E Koledok-o duodenal fistili	Fistül onarımı drenaj	24 s.	+	+	+	+	+	-	N	180 θ	4 gün Ex.		
11 38 K Koledok taşı	Kolesistektoni, koledoktomoi	72 s.	+	+	+	+	+	-	N	90 θ	5 gün Ex.		
12 42 E Mide Ca.	Mide rez.	4 tün	+	+	+	+	+	-	Amil.	286 Drenaj (+)	13 gün Ex.		
13 56 E Pilor stenozu	Trunkal vag. drenal	2 gün	+	+	+	+	+	-	N	70 θ	8 gün Ex.		

Mide - duodenum girişimleri ve özellikle koledok araştırılması yapılan ameliyatlarda duodenum'un distal bölümü ve Oddi sfinkterleri ile gereksiz ve aşırı manüpasyon sonucu da POAP oluşabilir (3). Ayrıca sfinkterotomi yapıılırken pankreas kanalının dikiş arasında alınması veya T dreni bacagının uzun bırakılarak pankreas kanalı ağzını tikaması da POAP'da neden olabilir.

Billroth II tipi mide rezeksiyonlarından sonra getirici anśın uzun bırakılması nedeni ile görülen duodenum durgunuğu da artan basınçla birlikte safranın regürjitasyonuna neden olarak pankreatite yol açabilir.

KORUNMA

Prognozu ağır ve tedavisi oldukça güçlük gösteren POAP cerrahlar için gerçekten çok sıkıcı ortaya çıktığında büyük bir oranla hastaların kaybedildiği ağır bir komplikasyondur. Böylesine ciddi ve tedavisi üç bir komplikasyonda korunmanın önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu konuda belirttiğimiz bütün nedenler üst karın ameliyatlarında önemle hatırlanmalıdır. Örneğin Billroth II tipi mide rezeksiyonu yaparken duodenumun a. gastroduodenalisten daha aşağı seviyelerde disseke edilmemesi ve anlatılan diğer bütün noktalara kesinlikle uyulması gerekmektedir. Bu özelliklere uyulmadan yapılan bir cerrahi girişimin akut pankreatitle sonuçlanması ise şaşırtıcı kabul edilmemelidir.

ÖZET

Bu çalışmada AÜTF Genel Cerrahi Bilim Dalında 1972-1981 yılları arasında yapılan cerrahi girişimler içinde saptanan 13 post operatif akut pankreatit (POAP) olgusu ve bu komplikasyondan korunma yöntemleri incelendi.

SUMMARY

Acute Pancreatitis Following Abdominal Operations And Its Prevention

Thirteen postoperative acute pancreatitis (POAP) cases have been discussed in this study. Their management and prevention of this complication were investigated.

KAYNAKLAR

- 1 - Artz, C. P., Hardy, J. C. : Complication in surgery and their management. P. 431-496, 1967.
- 2 - Burnet, W. E., ve ark. : Studies on so-called postgastrectomy pancreatitis. Ann Surg 149 : 739, 1959.
- 3 - Kayabali, İ. : Karın şirürjisinde erken dönemde reintervansiyon 1975-Ankara. AÜTF yayınlarından.
- 4 - Keghley, M. R. B., Graham, N. G. : The aetiology and prevention of acute pancreatitis following biliary tract operations. Br J Surg 60 : 149, 1973.
- 5 - Latariet, M. : Pancreatite aigue apres sfinctérotomie Lyon Chir., 61 : 775, 1965.
- 6 - Milbourne, E. : On acute pancreatic effections following gastric resection for ulcer and cancer and possibilities of avoid them. Acta Chir Scand 89 : 433, 1943
- 7 - Warren, K. W. : Acute pancreatitis and pancreatic injuries following subtotal gastrectomy. Surg 29 : 643, 1951.